# (R)

# vertīssements



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

## BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL: 105 F. Régisseur Recettes D.D.A. CCP DUON 3405-12 K.

🏗 (80)22.19.38 i

ÉDITION GRANDES CULTURES

Bulletin nº 27 - 28 octobre 1986

### ORGE D'HIVER - BLE

Jaunisse nanisante : les pucerons sont toujours présents

**COLZA** 

Charançon du bourgeon terminal : toujours à surveiller

### ORGE D'HIVER -

Les stades les plus fréquents, de 2 feuilles à début tallage pour les orges, sont plus échelonnés pour les blés : de levée à début tallage.

### - PUCERONS et JAUNISSE NANISANTE

### SITUATION:

Avec le changement de conditions météorologiques, les vols de pucerons sont très ra-

La présence des pucerons reste cependant observée, à un niveau variable, sur de nombreuses parcelles. Abrités à la base des plantes, ils sont plus difficiles à déceler. Les périodes douces sont favorables à une reprise d'activité.

### PRECONISATION:

Maintenir la surveillance des parcelles, plus particulièrement des parcelles non traitées mais aussi des parcelles traitées, surtout en cas d'intervention précoce.

Ne pas laisser en activité prolongée des populations, même stagnantes, supérieures au seuil d'un pied (ou 1 talle) sur 10 colonisé par au moins un puceron.

Une éventuelle intervention présentera la meilleure efficacité si elles est réalisée en bonnes conditions : températures douces et végétation sèche.

### COLZA

Depuis le début du mois d'octobre la végétation a bien évolué. Dans les situations hétérogènes au point de vue stades, les petits pieds ont rattrapé leur retard : les stades s'étalent de 5-6 feuilles à 9-10 feuilles.

P,79

### CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL

### SITUATION :

 Depuis le bulletin précédent de nouvelles captures sont observées dans 10 postes répartis comme suit:

Côte-d'Or

: secteur plaine (Chambeire) et hautes Côtes (Nolay)

Sud Nièvre

: Diennes Aubigny

Nord Saône-et-Loire: Chalon, Verdun S/Doubs

Haute-Saône

: Roche-Raucourt, Autrey les Gray

Jura

: Malanges, Vaudrey

Doubs

: St-Vit

- · Pas de nouveaux piégeages dans l'Yonne, les secteurs des plateaux en Côte-d'Or, le Sud de la Saône-et-Loire, et le Nord de la Nièvre.
- •De nombreuses parcelles ont reçu un traitement dans le courant de la semaine du 13 au 20 octobre : Elles sont toujours protégées vis-à-vis des nouvelles arrivées d'insectes.

### PRECONISATIONS :

- Faites une application insecticide dès que possible en fon ction des conditions météorologiques. Si les captures de charançons du bourgeon terminal ont lieu plus de 15 jours après une application insecticide avec une spécialité du type pyréthrinoïde.
- ➤ Dans les autres situations, en l'absence certaine de piégeage sur la parcelle, ne pas intervenir.

RAPPEL: Les parcelles ayant reçu un traitement microgranulé au semis ne sont plus protégées contre le charançon du bourgeon terminal.